



T.C.  
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI  
Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü



KİMYEVİ GÜBRE TESCİL BELGESİ

441 sayılı KHK, 20/08/2001 tarihli ve 2001/2960 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu karara istinaden yayımlanan Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği gereği, aşağıda adı ve ünvanı yazılı kişi veya kuruluşun başvurusu üzerine aşağıda özellikleri verilen kimyevi gübre tescil edilerek satışa sunulabilir bulunmuştur.

<b>Firmanın</b>	
Adı	DOKTOR TARSA Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bakanlık Lisans Türü	ÜRETİCİ
Bakanlık Lisans No	043
<b>Kimyevi Gübrenin</b>	
Tipi İsmi	NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU
Düzenlenirken esas alınan kriter	EC FERTİLİZER
Verilen Bakanlık Tescil No	14977
Marka veya Ticari Adı (varsa)	Speedfol Flower & Fruit SC 9.2-6.8-18.2 +TE
<b>Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler</b>	
Firmanın ticari ünvanı veya kısa adı	DOKTOR TARSA Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Gübre tip ismi	NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU
Birincil bitki besin maddesi kütlece %	Toplam Azot (N):9.2 Amonyum Azotu(N): 1.4 , Üre Azotu(N):3.4, Nitrat Azotu(N):4.4 Suda Çözünür: P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> :6.8 , K <sub>2</sub> O:18.2
İkincil bitki besin maddesi kütlece %	-
	Suda Çözünür: B:0.1,Cu:0.021, Fe:0.05, Mn:0.02, Mo:0.005, Zn:0.051
İz elementlerin şelatlama maddesinin adı ve miktarı	Cu,Fe,Mn ve Zn'nun tamamı EDTA ile şelatlı
Üretildiği Ülke	Türkiye
Net ağırlığı	25 kg
Depolama sıcaklığı	50 <sup>0</sup> C'den az
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Diğer işaretler	EC FERTİLİZER ibaresi, Çocuklardan uzak tutunuz ibaresi,uyarılar,parti seri,no, ürt.tar. son kullanma tarihi, uygulama şekli,dozu ve zamanı,firma adresi

İş bu belge verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Tarih :03/05/2011

  
Bahattin BOZKURT  
Genel Müdür Yardımcısı

## KİMYASAL GRUP

NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU

### DİKKAT!

Tarım ilaçları ile birlikte kullanıldığında, tarım ilaçlarının talimatlarına uyarak kullanılmaktadır. Sulama suyu ve akarsulara bulaşmasını engelleyiniz. İy Tarım Uygulama (GAP) biki besleme kurallarına bağlı olarak, bir danışman tavsiyesi ile kullanınız.

### DEPOLAMA

Ürün orijinal ambalajında ve sıkıca kapalı bir şekilde saklanmalı. İyi havalandırılan, temiz ve kuru, güvenli bir alanda depolanmalıdır. Depo sıcaklığı 5 °C'den az, 40 °C'den fazla olmamalıdır. Herbifisitler, güdü, hayvan yemi ve / veya tohum yakıtlarına depolamayı.

**ÇOCUKLARDAN VE TECRÜBESİZ OLMAYAN KİŞİLERDEN UZAK TUTUNUZ**  
**BOŞ AMBALAJLAR SUYLA İYİLE ÇALIKALANMALIDIR.** ÜRÜN AMBALAJI, BOŞ AMBALAJI VE BOŞ AMBALAJLAR YEREL YÖNETMELİĞE VE KURALLARA UYGUN OLARAK YOK EDİLMELİDİR.  
**GIDA MADDELERİYLE BİRLİKTE TAŞINMAYINIZ VE DEPOLAMAYINIZ.**  
**AMBALAJLARI YA DA UYGULAMA EKİPMANLARINI GÖLLERDE, AKARSULARDA VE DİĞER SU KAYNAKLARINDA YIKAMAYINIZ.**

### GARANTİ VE YÜKÜMLÜLÜK:

Üretici firma normal koşullarda bu ürünün kimyasal içeriğini ve etiketeki tavsiyelere uyulduğu zaman tamamlanan etkileri göstereceğini garanti etmektedir. Bu ürün yaygın bir şekilde çok farklı koşullarda kontrol edilmesine rağmen taselli ettiren firma, anormal iklim koşulları ve yanlış uygulama zamanı ve miktar gibi durumlarda göz önünde bulundurarak bütün koşullar altında ürünün etkinliğini garanti etmemektedir. Herhangi bir SPEEDFOL™ kullanımdan önce, ürün özelliklerini, ürün güvenlik bilgi belgesini ve ürünü uygulama bilgisini okuyunuz.

• SPEEDFOL™ bir SQM markasıdır.

### ÖZELLİKLERİ

SPEEDFOL™ FLOWER & FRUIT SC içerisinde NPK + 6 iz element bulunduran yüksek konsantrasyonlu süspansiyon formülasyonudur. SPEEDFOL™ FLOWER & FRUIT SC bikiyeye generatif dönemden besin noksanlıklarını ya da ağır uygulamalardan doğan dengesizlikleri önlemek ya da düzeltmek için ve çiçeklenmeyi, meyve tutumunu ve gelişimi için uygundur.

### KULLANMA TAVSİYELERİ

- Etiketle bulunan tavsiyeler genel olarak hazırlanmıştır. Farklı faktörlere, koşullara, kriterlere ve amaçlara göre değişiklik gösterebilir. Özel biki besleme programları ve SPEEDFOL™ biki besleme serisi ile ilgili bilgi için bayinizle ya da DRT Pazar Geliştirme Departmanına danışınız.
- SPEEDFOL™ FLOWER & FRUIT SC toprak uygulamalarına bir tamamlayıcıdır. Hiçbir durumda toprak uygulamalarının yerini doldurmaz. Gerekiirse toprak uygulamaları kullanılabilir.
- SPEEDFOL™ FLOWER & FRUIT SC'yi sabahın erken saatlerinde ya da akşamüstü uygulamak tercih edilmelidir.

### UYARI:

- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.



## BİTKİ BESLEME SÜSPANSİYONU

## YAPRAK UYGULAMALARI İÇİN



### GARANTİ ANALİZİ: Yaprak uygulamaları için NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU 9.2 - 6.8 - 18.2 + TE

Element	İçerik % w/w	Mikro Element	İçerik % w/w
Toplam Azot (N)	9.2	Suda çözümler Bor (B)	0.10
Nitrat Azot (N)	4.4	Suda çözümler Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile çözümlü	0.021
Amonyum Azot (N)	1.4	Suda çözümler Demir (Fe) Tamamı EDTA ile çözümlü	0.05
Diğer Azot (N)	3.4	Suda çözümler Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile çözümlü	0.02
Suda çözümler Fosfor Pentoksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	6.8	Suda çözümler Molibden (Mo)	0.005
Suda çözümler Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)	18.2	Suda çözümler Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile çözümlü	0.051

Bütün mikro elementler suda çözümlüdür.  
Selenyum stabil olduğu pH aralığı (pH 2 - pH 5)  
Selenyum stabil olduğu pH aralığı (pH 2 - pH 11)



Üretici Firma  
Doktor Tarso Tarım San. ve Tic. A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi  
2. Kısım 22. Cadde No:10  
07100 - ANTALYA / TÜRKİYE  
☎ 0 242 249 46 48 pax  
Alo DRT: 444 0 378 • www.drt.com.tr

Net Ağırlık  
**1,40 kg**  
Hacim  
**1 litre**  
Yönelim: 20 °C'de 1400 g/l

Bakım Kartı ve Teslim No:  
Ambalajın Üzerindedir. 043 /  
Üretim Tarihi:  
Ambalajın Üzerindedir.  
Son Kullanma Tarihi:  
Üretim tarihinden itibaren 5 yıl.



\* SPEEDFOL™ FLOWER & FRUIT SC içerisinde NPK + 6 iz element bulunduran yüksek konsantrasyonlu süspansiyon formülasyonudur.

ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ İYİCE OKUYUNUZ.

YANICI PATLAYICI VE ÇÜRÜTÜCÜ BİR ÜRÜN DEĞİLDİR.

www.sqm.com

### Uygulamalar için tavsiye edilen dozlar:

BİTKİ	ml/100 ltr	Açıklamalar
Elma ve Alıncık	300	Pehlülde meyve yaprakları tam gelişmiş meyve tutumuna ve meyve büyüme için en uygun doz olarak kullanılmalıdır.
Bereket ve Kerevizler	400	Seyir zamanı 45 litre suda en fazla 2 litre kadar kullanılmalıdır.
Hervey	300	Kök gelişiminde toprakta 2 litre kadar kullanılmalıdır.
Hububat	400	Bikiyi tam olarak gelişmeye kadar kullanınız. Kışın meyve oluşturma ve tohum oluşturma için kullanılmalıdır.
Kıvılcık	250	Speedfol™ Flower & Fruit SC'yi toprakta 1 kg/ha olarak kullanınız. 1 kg/ha olarak kullanıldığında toprakta 20-30 cm derinliğe kadar 1-2 litre suda uygulanmalıdır.
Hervey	350	Çiçeklenme ve meyve gelişim döneminde 1-2 litre suda uygulanmalıdır. Gerekli olduğu takdirde kullanılmalıdır.
Pamuk	400	Bikiyi tam olarak gelişmeye kadar kullanınız. Çiçeklenme ve meyve gelişim döneminde 1-2 litre suda uygulanmalıdır. Kışın meyve oluşturma ve tohum oluşturma için kullanılmalıdır.
Hervey, Kışık ve Kıvılcık	200	Bikiyi tam olarak gelişmeye kadar kullanınız. Çiçeklenme ve meyve gelişim döneminde 1-2 litre suda uygulanmalıdır. Gerekli olduğu takdirde kullanılmalıdır.
Sarımsak	300	Meyve oluşturma ve meyve gelişim döneminde kullanınız. 1-2 litre suda uygulanmalıdır.
Sarımsak, Üzüm	300	Çiçeklenme ve meyve gelişim döneminde kullanınız. 1-2 litre suda uygulanmalıdır.
Gübre öğütür ve meyve gelişim için	250	Çiçeklenme ve meyve gelişim döneminde 1-2 litre suda uygulanmalıdır. Gerekli olduğu takdirde kullanılmalıdır.
Hervey	400	Biki 50 cm boyunda iken ve gelişim döneminde kullanılmalıdır.
Sis Filtreleri	700	Çiçeklenme dönemi boyunca her 7-14 gün eniy bir kez kullanılmalıdır. Gerekli olduğu takdirde kullanılmalıdır.
Papatya	400	Bikiyi tam olarak gelişmeye kadar kullanınız. Çiçeklenme ve meyve gelişim döneminde 1-2 litre suda uygulanmalıdır. Gerekli olduğu takdirde kullanılmalıdır.
Sarımsak	250	Bikiyi tam olarak gelişmeye kadar kullanınız. Çiçeklenme ve meyve gelişim döneminde 1-2 litre suda uygulanmalıdır. Gerekli olduğu takdirde kullanılmalıdır.
Sarımsak, Üzüm	300	Bikiyi tam olarak gelişmeye kadar kullanınız. Çiçeklenme ve meyve gelişim döneminde 1-2 litre suda uygulanmalıdır. Gerekli olduğu takdirde kullanılmalıdır.
Hervey	400	Bikiyi tam olarak gelişmeye kadar kullanınız. Çiçeklenme ve meyve gelişim döneminde 1-2 litre suda uygulanmalıdır. Gerekli olduğu takdirde kullanılmalıdır.
Sarımsak	250	Bikiyi tam olarak gelişmeye kadar kullanınız. Çiçeklenme ve meyve gelişim döneminde 1-2 litre suda uygulanmalıdır. Gerekli olduğu takdirde kullanılmalıdır.
Sarımsak, Üzüm	300	Bikiyi tam olarak gelişmeye kadar kullanınız. Çiçeklenme ve meyve gelişim döneminde 1-2 litre suda uygulanmalıdır. Gerekli olduğu takdirde kullanılmalıdır.
Hervey	400	Bikiyi tam olarak gelişmeye kadar kullanınız. Çiçeklenme ve meyve gelişim döneminde 1-2 litre suda uygulanmalıdır. Gerekli olduğu takdirde kullanılmalıdır.
Sarımsak	250	Bikiyi tam olarak gelişmeye kadar kullanınız. Çiçeklenme ve meyve gelişim döneminde 1-2 litre suda uygulanmalıdır. Gerekli olduğu takdirde kullanılmalıdır.
Sarımsak, Üzüm	300	Bikiyi tam olarak gelişmeye kadar kullanınız. Çiçeklenme ve meyve gelişim döneminde 1-2 litre suda uygulanmalıdır. Gerekli olduğu takdirde kullanılmalıdır.

### KARŞILIK HAZIRLANMASI

Şişeyi kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Tankı yarısına kadar suyla doldurunuz. Önceden hazırlanan SPEEDFOL™ FLOWER & FRUIT SC karışımını tanka ekleyiniz ve karıştırarak çirye kalan ilbiyayı dıyan suyu ekleyiniz. SPEEDFOL™ FLOWER & FRUIT SC her türlü kara ve hava uygulamalarında kullanılmalıdır.

### KARŞILIKLILIK VE FITOKSİSİTE

SPEEDFOL™ FLOWER & FRUIT SC en yaygın biki koruma ürünleri ve biki besinleri karşılar. Bir tank karışımında ürünlerin toplam hacmini hiç bir zaman % 2 hacim / hacim oranını aşmamalıdır. Farklı ürünlerin tank karışımında 100 litre suya 2 litreten daha fazla eklenmesi önerilmemektedir. Bu kuralı her zaman uygulayınız. Uygulamalar için kullanınız. Bununla birlikte, diğer kimyasallarla karıştırılmadan önce bir karışım testi yapılması önemle tavsiye edilir. Etiketle tavsiye edilen dozlar ile uygulama yapıldığında fitotoksik etkiyi yoktur.


### KİŞİSEL GÜVENLİK EKİPMANLARI

Her zaman koruyucu eldiven ve vücutu örten kıyafetler giyiniz. Ayrıca kimyasallara karşı koruyucu gözlük ve veya sıyırma ya da tozuma olasılıklarında yüz maskesi kullanınız. Çiğme aletinde yüzü veya gözleri yitirmek için su kaynağı bulunmasını sağlayınız.

### HAVADAN YAPILAN UYGULAMALAR

SPEEDFOL™ FLOWER & FRUIT SC yerel yönetime köyü kullarına ve yönetime uygun olarak havadan uygulamaları için kullanılabilir. Mümkün olan en fazla suyu oranın kullanılarak, havadan yapılan uygulamalarda dozları kg'da olarak hesaplamak gerekir. Uçak ile yapılan uygulamalarda biki koruma ürünleri ile birlikte kullanılması halinde tavsiye edilen maksimum SPEEDFOL™ dozları 300 ml/da ya aşmamalıdır.

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısını olacağına taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.



**DOKTOR TARSA**  
**TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cad.  
Tel: 0242 249 46 48  
Kurumlar V.D. 309 003 8515