



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	DOKTOR TARSA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş.
Ticari Ünvanı	ÜRETİCİ
Lisans Türü	43
Lisans No	
Kimyevi Gübrenin	ÇİNKOLU GÜBRE SÜSPANSİYONU (Çinko Oksit İçerikli)
Tip İsmi	EC FERTİLİZER
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	17464
Tescil No	ZINCATE®
Marka veya Ticari Adı(Varsa)	
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş.
Gübre Tip İsmi	ÇİNKOLU GÜBRE SÜSPANSİYONU (Çinko Oksit İçerikli)
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür; Zn: 50
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı Ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	TÜRKİYE
Net Ağırlıkları	2-10-20-30 kg / 1-5-10-15-20 lt
Depolama Sıcaklığı	<40 °C
Diğer İşaretler	Ec Fertilizer, Çocuklardan Uzak Tutunuz, Parti Seri No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Firma Telefonu, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu Ve Zamanı, Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız, Net Ağırlık, Firma Beyanı
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni İle Yenileme
Bu belge 04/05/2018 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	
Bu Belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelere Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.	

Tarih: 04/05/2018

Ali Metin KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALANINIZI!
ZINCATE®

Toprak uygulamaları için tavsiye edilen dozlar:

Bitki	Uygulama Zamanı ve Sayısı	Doz c/da
Ortabiti bitkileri (domates, biber, patlıcan)	Fide dikiminden, sezon sonuna kadar uygulanabilir.	50
Açık tarla bitkileri (domates, biber, patlıcan, hıyır)	4-5 toprak döneminde ve gerekirse 10-14 gün aralığıyla uygulanır.	50
Kavun, Karpuz	2-4 toprak döneminde ve gerekirse tekrarlayınız. Gözler patladığında ve gelişme sonuna ulaştığınızda Çekilme zamanı kullanımından kaçınılmalıdır. Hasat sonrası uygulamaya geçecek ikkabinin gözleri için önerilir. İçerisinde Speedol Boon ile beraber uygulanır.	100
Sert çekirdekli (şeftali, kiraz, kayısı, erik)	Çekilme öncesi gözler uyumken ve pembe göz döneminde uygulanır. Meyve tutumundan hasada 1 ay kala kadar 2-3 hafta aralığıyla ve hasat sonrası uygulanır.	100
Tarımlar (buğday, arpa, çeltik)	Karşıleme döneminde uygulanır. Orta veya ağır noksanlıklarda 10-14 gün aralığıyla ve ağır noksanlıklarda 10-14 gün aralığıyla uygulanır.	30
Mısır	3-8 toprak döneminde ve ağır noksanlıklarda 10-14 gün aralığıyla uygulanır.	50
İkincil ve sonbahar sürgünlere zamanında uygulanır. İkinci durumda da ağır noksanlıklarda 10-14 gün aralığıyla tekrarlanabilir.		100
Pamuk	Çıkıştan 3-4 hafta sonra	50
Bay	Tomurcaklama döneminde ve meyve tutumu döneminde, gerekirse enlemeye kadar 2-3 hafta aralığıyla uygulanır. diğışiren uygulanır.	50
Zeytin	Gözler patladığında ve çanak yapraklar açıldığında uygulanır.	100
Çiçek	Yeşil göz döneminde uygulanır.	75
Patates	Bayrak göz döneminde ve hasat sonrası toprak gelişme döneminde uygulanır.	50
	Bitki çıkışından iki hafta sonra ve ağır noksanlıklarda 10-14 gün aralığıyla tekrar uygulanabilir.	50

www.drt.com.tr



ZINCATE®

EC FERTİLİZER
ÇİNKOLU GÜBRE SÜSPANSİYONU
(Çinko Oksit İçerikli)

ZINCATE®
Garanti Edilen İçerik % w/w
Toplam Çinko (Zn) 50



CEME İÇİN TEHLİKELİ MADDE.
SİM, B.A.B. 9, PC III

KİMYASAL GRUP
MİNERAL ELEMAN, BITKİ BESLEME ÜRÜNÜ.
UVARLAR, TEBİRLER ve DEPOLAMA
• P273: Çevreye verilmesinden kaçın.
• P280: Koruyucu eldiven/koruyucu baret/göz koruyucu/üz koruyucu kullanın.
• P301+P312: YUTULDUĞUNDA, kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 14 NOLU TELEFONUNU veya doktora/teknik araın.
• P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
• P411: 40 °C'yi aşmayacak sıcaklıkta sadece orijinal ambalajında depolayın.
• P501: İçerdiği kabı, yeri/bölgesi/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.
• Çocuklardan ve gıdadan uzak tutunuz.
• Asla uygun doza oranları aşmayın.
• Sadece gerekli yerlerde kullanınız.
• Toprak ve/veya yaprak analizi yapılarak gübre kullanımını tavsiye edilir.



Hücre: Sıcak ortamda gözle temasından kaçınınız.

1 Litre 2,00 kg

Net ağırlık : 2,00 kg
Üretim tarihi : Ambalaj üzerindedir.
Parti ve seri no : Üretim tarihinden itibaren 3 yıl
Son kullanma tarihi : 40 °C'den az
Depolama Sıcaklığı : 40 °C'den az
Bekletme Süresi : 043
Bekletme Süresi : 17464



Üretim Firması :
Doktor Tarisa Tarım San. Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
2. Kısım 22. Cad. No: 1007100
Büyükdere / Beşiktaş / İstanbul
Tel: (0212) 249 46 86 (pbx)
www.drt.com.tr



OLAYLANMIŞTIR

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısını olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

Ali Çetin KARAKAYA

Pazarlama ve Pazar Geliştirme Müdürü

DOKTOR TARSA TARIM SAN. VE TİCARET A.Ş.
Merkeze Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cad. No: 1007100 - Şişli / Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212 249 46 86 (pbx) / 0212 249 46 87 (pbx) / 0212 249 46 88 (pbx)
www.drt.com.tr
Ticaret Odası Sicil No: 38050