

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER

KATI DENİZ YOSUNU

atocrop_s

Garanti Edilen İçerik	(w/w)
Organik Madde	: % 30
Alginik Asit	: % 1,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	: % 12
pH	: 9-11
Maksimum EC (dS/m)	: 40

NET:



DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

AOSB 2. Kısım 22. Cadde No: 10 - 07190 - Döşemealtı / Antalya / Türkiye
Tel: 0 242 249 46 46 (Pbx) • Alo DRT: 444 0 378 • www.drt.com.tr • bilgi@dr.com.tr

UYARILAR ve TEDBİRLER

P264: Elleçlemeden sonra yüzü, elleri ve maruz kalan cildi su ve sabun ile iyice yıkayın.

P280: Korumayı eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun.

Asla uygun doz oranlarını aşmayın ve sadece gerekli yerlerde kullanın.

Bakanlık Lisans No : 6
Bakanlık Tescil No : 14298

KULLANIM TAVSİYELERİ

Özel bitki besleme programları ve **atocrop_s** ile ilgili bilgi için bayinize veya **Doktor Tarsa Şirketler Grubu**'na danışınız.

• **atocrop_s** doğal üründür. Çevreyi kirlilemez. Bitki tarafından alımı kolaydır. Serin vakitlerde uygulanmalıdır. Bütün bitki türlerinde uygulanabilir. Suda tavsiye edilen miktarda kullanılması halinde çözünür.

Damla Sulama Sistemleri ve/veya Yapraktan Uygulanabilir.

Kullanım Alanı, Miktarı ve Şekli

ÜRÜN	UYGULAMA ZAMANI	Topraktan Uygulama	Yapraktan Uygulama
Sera bitkileri için	Dikimden itibaren 15-20 gün ara ile sezon boyunca	150 g/da	100 g/100 L su
Ispanak, Marul	Çıktıktan veya dikimden 15-20 gün sonra	100 g/da	70 g/100 L su
Fasulye, Bezelye vb.	4-6 yaprak teşekkülünde, tam çiçeklenmede ve ilk dane oluşumunda olmak üzere 3 uygulama	100 g/da	60 g/100 L su
Patates, Soğan, Havuç, Pancar	Yumur oluşum döneminden sonra 15-20 gün ara ile 2 uygulama	100 g/da	80 g/100 L su
Hububat (Buğday, Arpa)	Kardeşlenme başlangıcında ot ilaçlarıyla beraber	80 g/da	200 g/100 L su
Pamuk	4-5 gerçek yapraklı dönemde	80 g/da	200 g/100 L su
Mısır	Bitki 15-20 cm boylandığında, çapa öncesi	100 g/da	200 g/100 L su
Meyve Ağaçları (Yumuşak Çekirdekli)	Fare kulağı döneminde ve meyve tutumundan 15-20 gün sonra	150 g/da	100 g/100 L su
Meyve Ağaçları (Sert Çekirdekli)	Çiçeklenme başlangıcında, tam çiçeklenmede, meyve tutumundan sonra ve hasattan 20 gün önce	150 g/da	80 g/100 L su
Narenciye	Çiçeklenme öncesi ve meyve gelişme dönemi	150 g/da	100 g/100 L su
Kesme Çiçek	Çiçek tomurcuğu gelişim öncesi	150 g/da	150 g/100 L su

*Etikette bulunan tavsiyeler genel şartlara göre hazırlanmıştır. Uygun dozlar, tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi için DRT Şirketler Grubunu arayınız.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kapa sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.

P411: 5°C ile 35°C aralığını aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.

P501: İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.

Depolama °C : +5 / +35°C

KARIŞIM HAZIRLANMASI

Gerekli miktarda **atocrop_s**'i tanka ekleyiniz. Tankı su ile tamamlayınız ve karıştırdıktan sonra kullanınız.

KARIŞILIRLILIK

En yaygın bitki koruma ürünleri ve bitki besinleri ile bitki karıştırmadan önce karışılabilirlik testi yapılmasını tavsiye ederiz.

GARANTİ ve YÜKÜMLÜLÜK

Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir. Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde **Doktor Tarsa** oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

Parti ve Seri No : Ambalajın Üzerindedir.
Üretim Tarihi : Ambalajın Üzerindedir.
Son Kullanım Tarihi : Üretim Tarihinden itibaren 3 yıl

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısının olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

Esin DURU
Ür&Ge Uzmanı

