



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmann	
Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	43
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BOR (B) MANGAN (Mn-SÜLFAT) ÇİNKO (Zn-SÜLFAT) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Düzenlenirken Esas Alman Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	17737
Marka veya Ticari Adı (varsa)	Speedfol Boman
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş.
Gübre Tip İsmi	BOR (B) MANGAN (Mn-SÜLFAT) ÇİNKO (Zn-SÜLFAT) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):6 Suda Çözünür Mangan(Mn):12 Suda Çözünür Çinko(Zn):5,5
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	/ 50 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz Uyarılar Parti Seri No Parti No Lisans ve Tescil No Firma Adı ve Adresi Firma Telefonu Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Son Kullanma Tarihi Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Net Ağırlık Üretim Tarihi Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı
Veriliş Nedeni	Süre Uzatma
Bu belge 07/03/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:07/03/2022

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Speedfol Boman

Speedfol Boman

EC FERTİLİZER
BOR (B), MANGAN (Mn-Sülfat), ÇİNKO (Zn-Sülfat)
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Bor (B)	: % 6,0
Suda Çözünür Mangan (Mn)	: % 12,0
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: % 5,5

KULLANMA TAVSİYELERİ

Üzüm bitki besleme programları ve SPEEDFOL® bitki besleme serisi ile ilgili bilgi için bayinize veya DOKTOR TARSA Pazar Geliştirme Departmanına danışınız.
• SPEEDFOL® Boman yapraklı ve topraklı gübre uygulamalarıdır.
• SPEEDFOL® Boman 1 sabahın erken saatlerinde ya da akşamüstü uygulamak tercih edilmektedir. Nem ya da sıcağı stresine maruz kalan bitkilere bu dönem boyunca uygulama yapılmaz.

Yaprak uygulamaları için tavsiye edilen dozlar

Ürün Adı	Uygulama Zamanı ve Sayısı	Doz g/100 L su ile
Yumuşak Çekirdekli Meyveler; Elma, Armut, Ayva	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulamaya yapılabilir. 10-14 gün aralığı tekrardanabilir.	250
Sert Çekirdekli Meyveler; Kiraz, Şeftali, Erik, Kayısı	Çiçeklenme öncesi uygulanır. İhtiyaça göre çiçeklenme sonrası 7-14 gün aralığı tekrardanabilir.	250
Kabuklu Meyveler; Ceviz, Badem, Fındık vb.	Çiçeklenme öncesi uygulanır. İhtiyaça göre çiçeklenme sonrası 7-14 gün aralığı tekrardanabilir.	250
Tahıllar; Buğday, Mısır, Arpa, Çavdar	Çiçeklenme öncesi uygulanır. İhtiyaça göre çiçeklenme sonrası 7-14 gün aralığı tekrardanabilir.	350
Baklagiller; Fasulye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vb.	Çiçeklenme öncesi uygulanır. Çiçeklenme sonrası 7-14 gün aralığı tekrardanabilir.	250
Yağ Bitkileri; Ayçiçeği, Soya, Kanola, Yerfıstığı, Susam, Aspir vb.	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrardanır.	300
Endüstri Bitkileri; Tütün, Çay, Hashaş, Anason, Gül vb.	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrardanır.	300
Yumurta ve Kökleri Yenilen Bitkiler; Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sarımsak, Turp vb.	Bitkiler 6-8 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrardanır.	300
Yem Bitkileri; Yonca, Korunga, Fıg, Yem bezelyesi vb.	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrardanır.	200
Sebzeler; Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabakgiller vb.	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulamaya yapılabilir. 10-14 gün aralığı tekrardanabilir.	300
Yaprak ve Çiğni Yenilen Bitkiler; Marul, Maydanoz, Espanak, Lahana, Karnabahar, Brokoli vb.	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrardanır.	300
Tropik Bitkiler; Muz, Avakado, Pasiflora, Papaya, Pitaya, Mango vb.	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulanır.	200
Narenciye	İkibahar ve sonbahar sürgünleri zamanında uygulanır. Her iki dönemde de orta ve ağır noksanlıklarda 10-14 gün sonra tekrar uygulamaya yapılması gerekir.	300
Pamuk	Erken dönemde ve çiçeklenme öncesi uygulanır.	300
Üzüm	İlk olabak çiçek tomurcukları ve çiçek salınımı bildirildiğinde ve ikinci olabak çiçek tomurcukları ayrıldığında uygulanır.	250
Kivi	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulamaya yapılabilir. 10-14 gün aralığı tekrardanabilir.	250
Çilek	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulamaya yapılabilir. 10-14 gün aralığı tekrardanabilir.	200
Süts Bitkileri	Bitkilerin erken dönemlerinde uygulamaya yapılabilir. 10-14 gün aralığı tekrardanabilir.	200
Mısır	Gelişiminin erken döneminde (4-6 yaprak dönemi) yettili yaprak alanı oluştuğunda uygulanır.	400
Çeltik	Başaklanma başlangıcında (bitki 4-6 yapraklı dönemde), 10 gün sonra tekrar bir uygulamaya yapılır.	400
Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulamaya yapılabilir.	400
Kavun - Karpuz	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulamaya yapılabilir.	200
Tarla bitkilerine yapılan uygulamalarda dekara en az 30 L su kullanılması tavsiye edilir.		
Toprak Uygulaması	Damlalı sulama sistemleriyle uygulanır. İhtiyaç dâhilinde tekrardanır.	300 g / da

Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlarda tarımsal analiz sonuçlarına göre uzman danışmanlarca belirlenebilir. İyi Tarım Uygulamaları (GAP) bitki besleme kurallarına bağlı olarak, bir danışman tavsiyesi ile kullanınız.

Speedfol Boman

Speedfol Boman

EC FERTİLİZER

UYARILAR, TEDBİRLER, DEPOLAMA

P264: Elleçmeden sonra yüzü, elleri ve maruz kalan cildi iyice yıkayın.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P305+P351+P338: GÖZ İLETEMASINDA: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Tahli ve yapması kolayca, kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimini arayın.
P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Kaba sıcağa kapalı tutun.
P411: 50°C'yi aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.
P501: İçerdiği/kabı, yeri/bölgesi/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.
Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun. Sadece gerekli yerlerde kullanın.
Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

GARANTİ VE YÜKÜMLÜLÜK

Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir. Olayın ilim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde Doktor Tarsa oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

SPEEDFOL® bir SQM markasıdır.

KARIŞIM HAZIRLANMASI

Tanka yansına kadar suyla doldurunuz, önceden hazırlanan SPEEDFOL® Boman karışımını tanka döktünüz ve karıştırırken geriye kalan ihtiyaç duyulan suyu ekleyiniz.

KARİŞİLEBİLİRLİK

SPEEDFOL® Boman en yaygın bitki koruma ürünleri ve bitki besinleri ile karışabilir. Bununla birlikte diğer kimyasallarla karıştırmadan önce bir karışım testi yapılması gerekir.

KİŞİSEL GÜVENLİK EKİPMANLARI

Her zaman koruyucu eldiven ve vücudu koruyan kıyafetler giyiniz, kimyasallara karşı koruyucu gözlük ve / veya sıçrama yada tozuma olası risklerinde yüz maskesi kullanınız. Çalışma alanında yüzü veya gözleri yıkamak için su kaynağı bulunmasını sağlayınız.



MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
YAPRAK VE TOPRAK UYGULAMALARI İÇİN

Speedfol Boman

EC FERTİLİZER



**Bor (B), Mangan (Mn-Sülfat), Çinko (Zn-Sülfat),
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı**

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Bor (B)	: % 6,0
Suda Çözünür Mangan (Mn)	: % 12,0
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: % 5,5



1 kg



ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ İYİCE OKUYUNUZ.
www.sqm.com • www.drt.com.tr

1 kg

Speedfol Boman

Speedfol Boman

EC FERTİLİZER

DIKKAT!
Ürünü kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
UYARI!
Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız
Asla uygun doz oranlarını aşmayınız



DIKKAT

H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H361D: Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H411: Sulcu ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.



Üretim Firma: **Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.**
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22 Cadde
No: 10 07190 - Doğanbeyli / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: 0 242 249 46 46 (Pbx) - Fax: 0 242 249 46 00
Alo DRT: 444 0 378 - www.drt.com.tr

Parti ve Seri Numarası: Bakanlık Lisans ve Teslim No:

Ambalajın Üzerindedir. 043 / 17737

Üretim Tarihi: Son Kullanma Tarihi:

Ambalajın Üzerindedir. Üretim Tarihinden itibaren 5 Yıl

Depolama Sıcaklığı °C: Net Miktarı: **1 kg**

1 kg

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısını olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

GÖKHAN AYNALI

Ürün Geliştirme Şefi

