



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	43
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BOR (B) BAKIR (Cu) DEMİR (Fe) MANGAN (Mn) MOLİBDEN (Mo) ve ÇİNKO (Zn) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	27896
Marka veya Ticari Adı (varsa)	DOCTO-COMBI®
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	BOR (B) BAKIR (Cu) DEMİR (Fe) MANGAN (Mn) MOLİBDEN (Mo) ve ÇİNKO (Zn) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):0,8 Suda Çözünür Bakır(Cu):0,5 Suda Çözünür Demir(Fe):4 Suda Çözünür Mangan(Mn):3 Suda Çözünür Molibden(Mo):0,1 Suda Çözünür Çinko(Zn):4
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	Cu,Fe,Mn,Zn tamamı EDTA ile şelatlıdır.
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 5 kg
Depolama Sıcaklığı	+5 / +35 °C
Diğer İşaretler	Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Üretim Tarihi Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No Parti Seri No Net Ağırlık
Veriliş Nedeni	Süre Uzatma
Bu belge 10/06/2025 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:10/06/2025

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

EC FERTİLİZER

MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

BOR (B), BAKIR (Cu), DEMİR (Fe),

MANGAN (Mn), MOLİBDEN (Mo), ÇİNKO (Zn)

DOCTO-COMBI®

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Suda Çözünür Bor (B) : % 0,8

Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır : % 0,5

Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır : % 4

Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır : % 3

Suda Çözünür Molibden (Mo) : % 0,1

Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır : % 4

Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Fe) : pH 3 - pH 6,5

Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Cu,Mn,Zn) : pH 4 - pH 11

NET: 1 kg

DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş
AOSB 2. Kısım 22. Cadde No: 10 - 07190 - Döşemealtı / Antalya / Türkiye
Tel: 0 242 249 46 46 (Pbx) • Alo DRT: 444 0 378 • www.drt.com.tr • bilgi@drt.com.tr

UYARILAR ve TEDBİRLER

P264: Elleçlemeden sonra yüzü, elleri ve maruz kalan cildi su ve sabun ile iyice yıkayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun.

Asla uygun doz oranlarını aşmayın ve sadece gerekli yerlerde kullanın.

Bakanlık Lisans No : 43

Bakanlık Tescil No :

KULLANIM TAVSİYELERİ

Özel bitki besleme programları ve **Docto-Combi®** ile ilgili bilgi için bayinize veya **Doktor Tarsa Şirketler Grubu'na** danışınız.

• **Docto-Combi®**, yapraktan ve topraktan güvenle uygulanabilir.

• **Docto-Combi®**, sabahın erken saatlerinde ya da akşamüstü uygulamak tercih edilmelidir.

Nem ya da sıcaklık stresine maruz kalan bitkilere bu dönem boyunca uygulama yapmayınız.

Kullanım Alanı, Miktarı ve Şekli

Bitki	Doz g / 100 L su ile	Uygulama Zamanı ve Sayısı
Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut, Ayva)	250	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir. Hasattan sonra, yapraklar dökülmeden önce uygulayınız.
Sert Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Şeftali, Erik, Kayısı)	250	Çiçeklenme sonrası 7-14 gün arayla tekrarlayınız. Hasattan sonra, yapraklar dökülmeden önce uygulayınız.
Kabuklu Meyveler (Ceviz, Badem, Fındık vb.)	250	Çiçeklenme öncesi uygulanır. İhtiyaça göre çiçeklenme sonrası 7-14 gün arayla tekrarlayınız. Hasattan sonra, yapraklar dökülmeden önce uygulayınız.
Tahıllar (Buğday, Yulaf, Arpa, Çavdar)	300	Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi arasında uygulayınız. Gerektiğinde bu dönemler arasında 10-14 gün arayla tekrar uygulamalar yapınız.
Baklagiller (Fasulye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vb.)	250	Çiçeklenme öncesi uygulanır. Çiçeklenme sonrası 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Yağ Bitkileri (Ayçiçeği, Soya, Kanola, Yerfistiği, Susam, Aspir vb.)	350	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Endüstri Bitkileri (Tütün, Çay, Haşhaş, Anason, Gül vb.)	300	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Yumruklı ve Kökleri Yeneyen Bitkiler (Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sarımsak, Turp vb.)	300	Bitkiler 6-8 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Yem Bitkileri (Yonca, Korunga, Fiğ, Yem Bezelyesi vb.)	200	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabakgiller vb.)	200	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.
Yaprağı ve Çiçeği Yeneyen Bitkiler (Marul, Maydanoz, Ispanak, Lahana, Karnabahar, Brokoli vb.)	300	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Tropikal Meyveler (Muz, Avokado, Pasiflora, Papaya, Pitaya, Mango vb.)	200	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulanır.
Narençye	300	İlkbahar ve sonbahar sürgünleri zamanında uygulayınız. Her iki dönemde de orta ve aşırı noksanlıklarda 10-14 gün sonra tekrar uygulama yapılması gerekir.
Pamuk	300	Erken dönemde ve çiçeklenme öncesi uygulanabilir.
Üzüm	200	İlk olarak çiçek tomurcukları ve çiçek salkımları belirdiğinde ve ikinci olarak çiçek tomurcukları ayrıldığında uygulayınız.
Kivi	250	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.
Çilek	200	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.
Süs Bitkileri	200	Bitkilerin erken dönemlerinde uygulama yapılır. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.
Mısır	300	Gelişmenin erken dönemlerinde (bitki 4-6 yapraklı dönemde) yeterli yaprak alanı oluştuğunda uygulayınız.
Çeltik	200	Başaklanma başlangıcında (bitki 4-6 yapraklı dönemde). 10 gün sonra tekrar bir uygulama yapılır.
Zeytin	300	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir.
Kavun - Karpuz	200	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir.

Toprak Uygulaması	0,5-1 L/da	Damla sulama sistemleri ile uygulanır. İhtiyaç durumuna göre tekrarlanır.
-------------------	------------	---

**Etiketle bulunan tavsiyeler genel şartlara göre hazırlanmıştır. Uygun dozlar, tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi için DRT Şirketler Grubunu arayınız.*

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.

P411: 5°C ile 35°C aralığında aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.

P501: İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.

Depolama °C : +5 / +35°C

KARIŞIM HAZIRLANMASI

Gerekli miktarda **Docto-Combi®**'yi tanka ekleyiniz. Tankı su ile tamamlayınız ve karıştırdıktan sonra kullanınız.

KARIŞABİLİRLİK

Docto-Combi® en yaygın bitki koruma ürünleri ve bitki besinleri ile karışabilir. Bununla birlikte diğer kimyasallarla karıştırmadan önce bir karışım testi yapılması gerekir.

GARANTİ ve YÜKÜMLÜLÜK

Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir. Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde **Doktor Tarsa** oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

Parti ve Seri No : Ambalajın Üzerindedir.

Üretim Tarihi : Ambalajın Üzerindedir.

Son Kullanım Tarihi : Üretim Tarihinden itibaren 3 yıl

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısını olacağımı taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

Esin DURU
Ür&Ge Uzmanı

DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cad.
No: 30 07190 - Döşemealtı / ANTALYA
Tic. Sic. No: 272900 - Mers: 08170012729000000
Alo DRT: 444 0 378 • www.drt.com.tr
KURUMSAL YOL: 2019 003 8515
Ticaret Odası Sicil No: 32050

EC FERTİLİZER
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARİŞIMI
BOR (B), BAKIR (Cu), DEMİR (Fe), MANGAN (Mn), MOLİBDEN (Mo), ÇİNKO (Zn)
DOCTO-COMBI®

Garanti Edilen İçerik	(w/w)	
Suda Çözünür Bor (B)	~% 0,8	
Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile Seletilidir	~% 0,5	
Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Seletilidir	~% 4	
Suda Çözünür Manganez (Mn) Tamamı EDTA ile Seletilidir	~% 3	
Suda Çözünür Molibden (Mo)	~% 0,1	Seletin stabil olduğu pH aralığı (Fe)
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Seletilidir	~% 4	Seletin stabil olduğu pH aralığı (Cu, Mn, Zn)
		pH 3 - pH 6,5
		pH 4 - pH 11

KULLANIM TAVSİYELERİ

Özel bitki besleme programları ve Docto-Combi® ile ilgili bilgi için bayinize veya Doktor Tarsa Şirketler Grubu'na danışınız.

• Docto-Combi®, toprakta ve toprakta güvenle uygulanabilir.

• Docto-Combi®, toprakta en uygun şekilde ya da akümüsi uygulamak tercih edilmelidir.

Nem ya da sıcaklık stresine maruz kalan bitkilere bu döner boyunca uygulama yapılmaz.

Kullanım Alanı, Miktarı ve Şekli

Bitki	Doz g/100 L su ile	Uygulama Zamanı ve Şekli
Tamamı Çözünür Meyveler (Elma, Armut, Ayva)	250	Çökelme öncesi ve sonrası uygulanabilir. 10-14 gün aralığı ile uygulanabilir. Hasattan sonra, toprakla dökülmüş önce uygulanır.
Sert Çekirdekli Meyveler (Alma, Şeftali, Elma, Kayısı)	250	Çökelme öncesi 7-14 gün aralığı ile uygulanır. Hasattan sonra, toprakla dökülmüş önce uygulanır.
Kabuklu Meyveler (Erik, Badem, Fındık vb.)	250	Çökelme öncesi uygulanır. Hasattan sonra, toprakla dökülmüş önce uygulanır.
Tahıllar (Buğday, Yulaf, Arpa, Çavdar)	300	Karşılaşma ve sapla kalma dönemi arasında uygulanır. Gerekli olduğu bu dönemler arasında 10-14 gün aralığı ile uygulanabilir.
Baklagiller (Fasulye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vb.)	250	Çökelme öncesi uygulanır. Çökelme sonrası 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Yağ Bitkileri (Ayçiçeği, Soya, Kanola, Yerfıstığı, Susam, Keten vb.)	350	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekli 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Endüstri Bitkileri (Tütün, Çay, Haşhaş, Anason, Gül vb.)	300	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekli 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Tamamı ve Kısmen Yem Bitkileri (Patates, Pancar, Havuç, Salatalık, Sarmısak, Taze soğan vb.)	300	Bitkiler 6-8 yapraklı iken uygulanır. Gerekli 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Yem Bitkileri (Yonca, Kuru yonca, Fıstık, Yem bezelyesi vb.)	200	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekli 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Sebzeler (Domates, Fıstık, Havuç, Patlıcan, Kabakgiller vb.)	200	Çökelme öncesi ve sonrası uygulanabilir. 10-14 gün aralığı ile uygulanabilir.
Tıpağı ve Çiğni İrren Bitkiler (Mısır, Mayız, Arpa, Çiğni, Karnıyarık, Bıkoğlu vb.)	300	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekli 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Tıpağı Meyveler (Alma, Armut, Elma, Fındık, Patlıcan, Patates, Fıstık, Haşhaş vb.)	200	Çökelme öncesi ve sonrası uygulanır.
Narenciye	300	Baklava ve sonbahar sürgünleri zamanında uygulanır. Her iki dönemde de orta ve ağır topraklılarda 10-14 gün sonra tekrar uygulanması gerekir.
Parmak	300	Fidan dönemi ve büyüme öncesi uygulanabilir.
Üzüm	200	İlk olarak çiçek tohumları ve çiçek tohumları bitirildikten ve ikinci olarak çiçek tohumları bitirildikten uygulanır.
Kivi	250	Çökelme öncesi ve sonrası uygulanabilir. 10-14 gün aralığı ile uygulanabilir.
Çilek	200	Çökelme öncesi ve sonrası uygulanabilir. 10-14 gün aralığı ile uygulanabilir.
Çiğni Bitkileri	200	Bitkiler erken dönemlerinde uygulanır. 10-14 gün aralığı ile uygulanabilir.
Mısır	300	Gelişimi erken dönemlerinde (bitki 4-6 yapraklı dönemleri) yeterli toprak alan dışındaki uygulanır.
Çeltik	200	Başlangıçta başlangıçta (bitki 4-6 yapraklı dönemleri) 10 gün sonra tekrar bir uygulama yapılır.
Arpa	300	Çökelme öncesi ve sonrası uygulanabilir.
Çavdar - Karpuz	200	Çökelme öncesi ve sonrası uygulanabilir.
Tıpağı Uygulanması	0,5-1 l/da	Damlı sulama sistemi ile uygulanır. İhtiyaç durumunda göre tekrarlanır.

*Etiketler bulunan tavsiyeler genel şartlara göre hazırlanmıştır. Uygun dozlarda, tarafsız analiz sonuçları ve bitkilerin gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi için DRT Şirketler Grubu'na danışınız.



NET: 1 kg

Doktor Tarsa®

DOCTO-COMBI®

BOR (B), BAKIR (Cu), DEMİR (Fe), MANGAN (Mn), MOLİBDEN (Mo), ÇİNKO (Zn)
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARİŞIMI
EC FERTİLİZER

EC FERTİLİZER
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARİŞIMI
BOR (B), BAKIR (Cu), DEMİR (Fe), MANGAN (Mn), MOLİBDEN (Mo), ÇİNKO (Zn)
DOCTO-COMBI®

UYARILAR ve TEDBİRLER

P264: Eleçlemeden sonra yüzü, elleri ve maruz kalan cildi su ve sabun ile iyice yıkayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yağ koruyucu kullanın.

Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun. Asla uygun doz oranlarını aşmayın ve sadece gerekli yerlerde kullanın.

Bakanlık Lisans No : 43

Bakanlık Tesit No :

DEPOLAMA

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabi sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.

P411: 5°C ile 35°C aralığını aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.

P501: İçeriği/kabı, yeri/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.

Depolama °C : +5 / +35°C



NET: 1 kg

Doktor Tarsa®

EC FERTİLİZER
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARİŞIMI
BOR (B), BAKIR (Cu), DEMİR (Fe), MANGAN (Mn), MOLİBDEN (Mo), ÇİNKO (Zn)
DOCTO-COMBI®

KARİŞİM HAZIRLANMASI

Gerekli miktarda Docto-Combi®'yi tanka ekleyiniz. Tankı su ile tamamlayınız ve karıştırdıktan sonra kullanınız.

KARİŞİMLİLİK

Docto-Combi® en yaygın bitki koruma ürünleri ve bitki besinleri ile karışabilir.

Bununla birlikte diğer kimyasallarla karıştırmadan önce bir karışım testi yapılması gerekir.

GARANTİ ve YÜKÜMLÜLÜK

Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir. Olası andığı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde Doktor Tarsa oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

Parti ve Seri No :

Üretim Tarihi :

Son Kullanım Tarihi :

Ambalajın Üzerindedir.

Ambalajın Üzerindedir.

Üretim Tarihinden itibaren 3 yıl



DOKTOR TARSAN SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.
AKSAR 2. Kısım 22. Cadde No: 10 - 07190 - Dışörmü / Antalya / Türkiye
Tel: 0 242 249 46 46 (Pbx) - Alo DRT: 444 0 378
www.drt.com.tr - bilgi@dr.com.tr

Doktor Tarsa®

NET: 1 kg



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



Sayı : E-70390991-155.99-19666902
Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi Süre
Uzatma-(OLT Başvuru No: 52887)-[Tescil
No: 27896]

10.06.2025

DOKTOR TARSA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
AOSB 2. Kısım Mahallesi 22. Cad. No:10
Döşemealtı / ANTALYA

İlgi : 10.06.2025 tarihli ve OLT.52887 sayılı yazınız.(16/05/2025 tarihli başvurunuz).

Bakanlığımızca, 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 13.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü bulundukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir. Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği
- 3 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 3E6FEF21-AAB5-4F16-B194-C9A1D19D2726

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 12 Faks:0 (312) 258 83 21
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Nursel DELİKAYA
Mühendis

