

EC FERTİLİZER PK GÜBRE ÇÖZELTİSİ SPEEDFOL® PhosphoZinc 0-28.2-5+ME

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) : % 28,2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) : % 5
Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 9,2

NET:



DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

AOSB 2. Kısım 22. Cadde No: 10 - 07190 - Döşemealtı / Antalya / Türkiye

Tel: 0 242 249 46 46 (Pbx) • Alo DRT: 444 0 378 • www.drt.com.tr • bilgi@drt.com.tr



Tehlike!

H290: Metalleri aşındırabilir.

H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H411: Sulul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

UYARILAR ve TEDBİRLER

P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.

P264: Elleçlemeden sonra yüzü, elleri ve maruz kalan cildi su ve sabun ile iyice yıkayın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P310: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P303+P361+P353: CİLT [veya saç] ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın [veya duş alın].

P305+P351+P338: GÖZLERDE İSE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.

Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun.

Asla uygun doz oranlarını aşmayın ve sadece gerekli yerlerde kullanın.

Bakanlık Lisans No : 43
Bakanlık Tescil No : 13109

KULLANIM TAVSİYELERİ

Özel bitki besleme programları ve **Speedfol®** bitki besleme serisi ile ilgili bilgi için bayinize veya

Doktor Tarsa Şirketler Grubu'na danışınız.

• **Speedfol® PhosphoZinc** gerekirse topraktan uygulanabilir.

• **Speedfol® PhosphoZinc** 'i sabahın erken saatlerinde ya da akşamüstü uygulamak tercih edilmelidir.

Nem ya da sıcaklık stresine maruz kalan bitkilere bu dönem boyunca uygulama yapmayınız.

• **Potasyum (K), Fosfor (P) ve Çinko (Zn) içerikli gübre çözeltisi**

Yaprak uygulamaları için tavsiye edilen dozlar

Bitki	Doz ml / 100 L su ile	Uygulama Zamanı ve Sayısı
Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut, Ayva)	200	Çiçeklenme öncesi döneminde ve hasat sonrası döneminde uygulama yapılır.
Sert Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Şeftali, Erik, Kayısı)	200	Meyve gözleri kabarmaya başladığı dönemde uygulama yapılır. Hasattan sonra uygulama yapılmalıdır.
Kabuklu Meyveler (Ceviz, Badem, Fındık vb.)	200	Çiçeklenme öncesi uygulanır. İhtiyaca göre çiçeklenme sonrası uygulanabilir. Hasattan sonra uygulama yapılmalıdır.
Tahıllar (Buğday, Yulaf, Arpa, Çavdar)	300	4 yapraklı dönemden başlanma öncesine kadar uygulayınız. Gerektiğinde 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.
Baklagiller (Fasulye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vb.)	250	Bitkiler 15 cm de iken uygulanır. Çiçeklenme sonrası 7-14 gün arayla tekrarlanabilir.
Yağ Bitkileri (Ayçiçeği, Soya, Kanola, Yerfıstığı, Susam, Aspir vb.)	300	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Endüstri Bitkileri (Tütün, Çay, Haşhaş, Anason, Gül vb.)	200	Bitkiler 15-20 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Yumrulu ve Kökleri Yenen Bitkiler (Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sarımsak, Turp vb.)	300	Bitkiler 15-20 cm büyüklüğünde iken 2 uygulama yapılır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Yem Bitkileri (Yonca, Korunga, Fiğ, Yem Bezelyesi vb.)	200	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabakgiller vb.)	200	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.
Yapraklı ve Çiçeği Yenen Bitkiler (Marul, Maydanoz, Ispanak, Lahana, Karmabahar, Brokoli vb.)	300	Gövde gelişmesi / baş oluşumu döneminden başlayarak, hasata kadar 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapılır.
Narenciye	200	Çiçeklenme öncesi, çiçeklenme sonrası ve meyve gelişim dönemi uygulama yapılmalıdır.
Pamuk	300	Erken dönemde ve çiçeklenme öncesi uygulanabilir.
Üzüm	200	Çiçeklenme öncesi ve dana tutumu sonrası uygulama yapılır. Hasattan sonra uygulama yapılmalıdır.
Kivi	200	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.
Çilek	250	Çiçeklenme başlangıcı, tam çiçeklenme ve meyve gelişim dönemlerinde 3 uygulama yapılmalıdır.
Süs Bitkileri	200	Bitkilerin erken dönemlerinde uygulama yapılır. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.
Mısır	300	4-6 yapraklı dönemde uygulama yapılır. Gerekirse 10-14 gün sonra tekrarlanabilir.
Çeltik	300	Başaklanma başlangıcında (bitki 4-6 yapraklı dönemde). 10 gün sonra tekrar bir uygulama yapılabilir.
Zeytin	250	Tomurculanma ve çiçeklenme öncesi dönemlerinde ve hasattan sonra uygulayınız.
Kavun - Karpuz	250	Dikimden 10-14 gün sonra başlayarak 7-10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılmalıdır.
Toprak Uygulaması	0,5-1 L / da	Damla sulama sistemleri ile uygulanır. İhtiyaç durumuna göre tekrarlanır.

**Etiketle bulunan tavsiyeler genel şartlara göre hazırlanmıştır. Uygun dozlar, tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi için DRT Şirketler Grubunu arayınız.*

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.

P411: 5°C ile 35°C aralığında aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.

P501: İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.

Depolama °C : +5 / +35°C

KARIŞIM HAZIRLANMASI

Tankı yarısına kadar suyla doldurunuz, önceden hazırlanan **Speedfol®** karışımını

tanka dökünüz ve karıştırırken geriye kalan ihtiyaç duyulan suyu ekleyiniz.

KARIŞABİLİRLİK

En yaygın bitki koruma ürünleri ve bitki besinleri ile karıştırmadan önce karışabilirlik testi yapılmasını tavsiye ederiz.

GARANTİ ve YÜKÜMLÜLÜK

Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir.

Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde **Doktor Tarsa** oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

Parti ve Seri No : Ambalajın Üzerindedir.
Üretim Tarihi : Ambalajın Üzerindedir.
Son Kullanım Tarihi : Üretim Tarihinden itibaren 3 yıl

