



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA KÖRÜ
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	43
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BOR (B) MANGAN (Mn-SÜLFAT) ve ÇİNKO (Zn-SÜLFAT) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	2025TK11711
Marka veya Ticari Adı (varsa)	Powerfol®Boman
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	BOR (B) MANGAN (Mn-SÜLFAT) ve ÇİNKO (Zn-SÜLFAT) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):6 Suda Çözünür Mangan(Mn):12 Suda Çözünür Çinko(Zn):5,5
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 5 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 40 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	/ 50 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz Uyarılar Firma Telefonu Parti Seri No Parti No Lisans ve Tescil No Firma Adı ve Adresi Üretim Tarihi Son Kullanma Tarihi Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Net Ağırlık Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Firma Beyanı Tahriş Edici
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 02/01/2025 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:02/01/2025

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

EC FERTİLİZER

MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

BOR (B) MANGAN (Mn-Sülfat), ÇİNKO (Zn-Sülfat)

Powerfol®

Boman

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Suda Çözünür Bor (B) : % 6,0

Suda Çözünür Mangan (Mn) : % 12,0

Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 5,5

NET: 1 kg

ÜRETİCİ FİRMA: DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
AOSB 2. Kısım 22. Cadde No: 10 - 07190 - Döşemealtı / Antalya / Türkiye
Tel: 0 242 249 46 46 (Pbx) • Alo DRT: 444 0 378 • www.drt.com.tr



Tehlike!
H360FD: Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

UYARILAR ve TEDBİRLER
P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P264: Elleçlemeden sonra yüzü, elleri ve maruz kalan cildi su ve sabun ile iyice yıkayın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P305+P351+P338: GÖZ TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.
Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P310: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P391: Döküntüleri toplayın.
Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun.
Asla uygun doz oranlarını aşmayın ve sadece gerekli yerlerde kullanın.

Bakanlık Lisans No : 43
Bakanlık Tescil No :

KULLANIM TAVSİYELERİ
Özel bitki besleme programları ve **Powerfol®** bitki besleme serisi ile ilgili bilgi için bayinize veya **Doktor Tarsa Şirketler Grubu'na** danışınız.
• **Powerfol® Boman** yaprakтан ve topraktan güvenle uygulanabilir.
• **Powerfol® Boman** 'ı sabahın erken saatlerinde ya da akşamüstü uygulamak tercih edilmelidir.
Nem ya da sıcaklık stresine maruz kalan bitkilere bu dönem boyunca uygulama yapmayınız.

Yaprak uygulamaları için tavsiye edilen dozlar

Ürün Adı	Doz g / 100 L su ile	Uygulama Zamanı ve Sayısı
Yumuşak Çekirdekli Meyveler; Elma, Armut, Ayva	250	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulamaya yapılabilir. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir. Hasattan sonra, yapraklar dökülmeden öncede uygulanır.
Sert Çekirdekli Meyveler; Kiraz, Şeftali, Erik, Kayısı	250	Çiçeklenme öncesi uygulanır. İhtiyaca göre çiçeklenme sonrası 7-14 gün arayla tekrarlayınız. Hasattan sonra, yapraklar dökülmeden öncede uygulanır.
Kabuklu Meyveler; Ceviz, Badem, Fındık vb.	250	Çiçeklenme öncesi uygulanır. İhtiyaca göre çiçeklenme sonrası 7-14 gün arayla tekrarlayınız. Hasattan sonra, yapraklar dökülmeden öncede uygulanır.
Tahıllar; Buğday, Yulaf, Arpa, Çavdar	350	Karışık besleme ve sapa kalkma dönemi arasında uygulayınız. Gerektiğinde bu dönemler arasında 10-14 gün arayla tekrar uygulamalar yapınız.
Baklagiller; Fasulye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vb.	250	Çiçeklenme öncesi uygulanır. Çiçeklenme sonrası 7-14 gün arayla tekrarlayınız.
Yağ Bitkileri; Ayçiçeği, Soya, Kanola, Yerfıstığı, Susam, Aspir vb.	300	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.
Endüstri Bitkileri; Tütün, Çay, Haşhaş, Anason, Gül vb.	300	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.
Yumruğu ve Kökleri Yenilen Bitkiler; Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sarımsak, Turp vb.	300	Bitkiler 6-8 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.
Yem Bitkileri; Yonca, Korumga, Fiğ, Yem bezelyesi vb.	200	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.
Sebzeler; Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabakgiller vb.	300	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulamaya yapılabilir. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.
Yapraklı ve Çiçeği Yenilen Bitkiler; Marul, Maydanoz, Ispanak, Lahana, Karnabahar, Brokoli vb.	300	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.
Tropik Bitkiler; Muz, Avakado, Pasiflora, Papaya, Pitaya, Mango vb.	200	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulanır.
Narenciye	300	İlk bahar ve sonbahar sürgünleri zamanında uygulayınız. Her iki dönemde de orta ve aşırı noksanlıklarda 10-14 gün sonra tekrar uygulamaya yapılması gerekir.
Pamuk	300	Erken dönemde ve çiçeklenme öncesi uygulanabilir.
Üzüm	250	İlk olarak çiçek tomurcukları ve çiçek salkımları belirlediğinde ve ikinci olarak çiçek tomurcukları ayrıldığında uygulayınız.
Kivi	250	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulamaya yapılabilir. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.
Çilek	200	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulamaya yapılabilir. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.
Süs Bitkileri	200	Bitkilerin erken dönemlerinde uygulamaya yapılır. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.
Mısır	400	Gelişimin erken dönemlerinde (4-6 yaprak dönemi) yeterli yaprak alanı oluştuğunda uygulayınız.
Çeltik	400	Başaklanma başlangıcında (bitki 4-6 yapraklı dönemde), 10 gün sonra tekrar bir uygulama yapılır.
Zeytin	400	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulamaya yapılabilir.
Kavun - Karpuz	200	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulamaya yapılabilir.

Tarla bitkilerine yapılan uygulamalarda dekara en az 30 Litre su kullanılması tavsiye edilir.

Toprak Uygulaması	300 g / da	Damlı sulama sistemleriyle uygulanır. İhtiyaç dahilinde tekrarlanır.
-------------------	------------	--

*Etiketle bulunan tavsiyeler genel şartlara göre hazırlanmıştır. Uygun dozlar, tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi için DRT Şirketler Grubunu arayınız.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kapa sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.

P411: 50°C'yi aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.

P501: İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.

Depolama °C : 50°C'den az

KARIŞIM HAZIRLANMASI

Tankı yarıya kadar suyla doldurunuz, önceden hazırlanan **Powerfol® Boman** karışımını tanka dökünüz ve karıştırırken geriye kalan ihtiyaç duyulan suyu ekleyiniz.

KARIŞILIRLILIK

Powerfol® Boman en yaygın bitki koruma ürünleri ve bitki besinleri ile karışabilir. Bununla birlikte diğer kimyasallarla karıştırmadan önce bir karışım testi yapılması gerekir.

GARANTİ ve YÜKÜMLÜLÜK

Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir. Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde Doktor Tarsa oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

Parti ve Seri No : Ambalajın Üzerindedir.
Üretim Tarihi : Ambalajın Üzerindedir.
Son Kullanım Tarihi : Üretim Tarihinden itibaren 5 yıl

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısını olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

Esin DURU
Ür&Ge Uzmanı





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

Sayı : E-70390991-155.99-17416129
Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi-(OLT
Başvuru No: 47033)-[Tescil No:
2025TK11711]

02.01.2025

DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
AOSB2KISIM MAHALLESİ 22. CAD. NO: 10 DÖŞEMEALTI / ANTALYA

İlgi : Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31.12.2024 tarihli ve OLT.47033 sayılı yazısı.

İlgi: 27/12/2024 tarihli başvurunuz

Bakanlığımızca, 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 13.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü bulundukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir. Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: A82CE46F-C018-4981-AB94-A0B612C038C1

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 12 Faks:0 (312) 258 83 21
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Yonca
YIKILMAZOĞLU
Mühendis
Telefon No:(312) 258 83 32

